

各野菜の参考使用設計表

●育苗時からの散布が重要です。

品種	苗の種類	播種後	発芽直後	5日から7日後	仮植直後	接木活着後	5日から7日後	購入苗到着時	定植前	定植後	約1月から2月毎
希釈倍率		400倍	400倍	200倍から400倍	200倍から400倍	200倍から400倍	200倍から400倍	200倍から400倍	200倍	500倍から千倍	500倍から千倍
ナス	自根		○	○	○				○	○	○
	接木					○	○		○	○	○
	購入苗							○	○	○	○
トマト	自根		○	○	○				○	○	○
	接木					○	○		○	○	○
	購入苗							○	○	○	○
キュウリ	自根		○	○	○				○	○	○
	接木					○	○		○	○	○
	購入苗							○	○	○	○
ピーマン	自根		○	○	○				○	○	○
	購入苗							○	○	○	○
シシトウ			○	○	○				○	○	○
イチゴ		親株定植時	苗仮植時	○					○	○	○
スイカ			○	○	○				○	○	
メロン			○	○	○				○	○	
かぼちゃ		○	○	○					○		

品種	苗の種類		発芽直後	5日から7日後		葉採類2回目15日後		購入苗到着時	定植前	定植後	約1月から2月毎
希釈倍率			400倍	200倍から400倍		200倍から400倍		200倍から400倍	200倍	500倍から千倍	500倍から千倍
さやえんどう			○	○					○		
えだまめ			○	○					○		
さやいんげん			○	○					○		
米(コメ)				○		○		○	○		
白菜				○		○			○		
キャベツ				○		○			○		
ブロッコリー				○		○			○		
玉ねぎ				○		○			○		○
レタス				○		○			○		
ネギ				○		○			○		
ホウレンソウ				○		○					
ジャガイモ									○	○	

注) 有機栽培は、葉採類も定植後約500倍から千倍、以降20日後500倍から千倍で散布して下さい。

注) 元気根っこバイオ1の効果が高い為、必ず200倍以上に希釈して、使用回数は様子を見て御使用下さい。